

SABERES DE LA CUENCA | 3ª EDICIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA POTRERILLO

Guía de las Aves del CORREDOR TURÍSTICO DEL NIMA



Guía de las Aves del
CORREDOR TURÍSTICO
DEL NIMA



Este guía es el resultado del trabajo colaborativo con el Club de Avistadores del Nima de la I.E. Sagrada Familia Potrerillo. Líderes comunitarios del Corredor Turístico del Nima.

Autores

Institución Educativa Sagrada Familia Potrerillo
Juan Manuel Quintero Ospina
Germán Morales Zúñiga

Diseño y Diagramación

Juan Camilo Sabogal

Fuentes Fotográficas

WikiAves ICESI - COLOMBIA
Juan Manuel Quintero Ospina

Impresión

Fundación Smurfit Westrock

Universidad Autónoma de Occidente

Unidad de Turismo Sostenible - Escuela de Turismo

Instituto de Estudios para la Sostenibilidad

Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Emprendimiento

Smurfit Westrock

Fundación Smurfit Westrock Colombia

Tercera Edición

2025



Trogon
Collarejo

INTRODUCCIÓN

El Corredor Turístico del Nima (CTN), situado sobre el flanco occidental de la cordillera Central en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), es una figura que integra distintos nodos asociados principalmente a emprendimientos y recursos-atractivos que están enmarcados dentro del Turismo de Naturaleza como alternativa de desarrollo local.

Estos nodos están distribuidos a lo largo de un gradiente altitudinal que va desde los 1200 hasta los 3850 msnm, abarcando una gran diversidad de ecosistemas de los orobiomas Bajo, Medio y Alto de los Andes Centrales de Colombia que incluyen: coberturas de arbustales, matorrales y bosques en zonas de transición entre ambientes secos y húmedos del piso térmico medio-cálido en el piedemonte y la baja montaña; bosques fríos o templados muy húmedos de la media montaña; bosques altoandinos (achaparrados) en ecotonos-ecoclinas o zonas de transición al páramo entre la media y alta montaña; y herbazales y pajonales muy fríos y muy húmedos situados en páramos.

La diversidad de ecosistemas, ambientes y hábitats en coberturas vegetales relativamente bien conservadas (en parte por la incidencia de la Reserva Forestal Protectora Nacional de Amaime, del Parque Natural Regional del Nima y del Parque Nacional Natural Las Hermosas), permite el sostenimiento de una alta diversidad de especies de aves, que se estima puede estar entre un 20-25% del total de la riqueza específica de Colombia que es aproximadamente 1932. Con esta diversidad de aves en mente y dada la importancia de la apropiación del conocimiento por parte de la comunidad local y de la integración de los distintos nodos en la consolidación del CTN como un destino turístico, la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, con el apoyo de Smurfit Westrock Fundación Colombia, ha realizado la tercera edición de la guía de aves Saberes de la Cuenca, de la Institución Educativa Sagrada Familia de Potrerillo, teniendo en cuenta algunas de las aves que se pueden encontrar a lo largo del gradiente altitudinal del corredor.

La ampliación del rango altitudinal y el diseño del formato de la guía, respecto a ediciones anteriores, también responde a solicitudes hechas por la comunidad de observadores de aves del CTN, representada por líderes comunitarios, docentes y estudiantes de la institución educativa, quienes hacen parte del Club de Observadores de Aves del Nima. De esta manera, la presente edición de Saberes de la Cuenca, Guía Ilustrada de las Aves del Corredor Turístico del Nima, expone 86 especies de aves del CTN que representan una muestra de su diversidad biológica, siendo unas más comunes, llamativas o fáciles de avistar que otras, pero al final todas aportan en la consolidación del avistamiento de aves como una actividad turística, educativa o recreativa.

El desarrollo de esta nueva versión también presenta un formato compacto, sencillo e intuitivo, con la posibilidad de escanear códigos QR para ampliar información de cada especie en el portal web de WikiAves.com, en el cual se podrán revisar atributos relacionados con la taxonomía, vocalizaciones, distribución, alimentación, estados de conservación, subespecies, aspectos etológicos y reproductivos, además de fotografías. De este modo se espera que la comunidad del CTN pueda tener un panorama más amplio, tanto en la identificación de las aves como en la conservación de los ecosistemas que le sirven de sustento y que son el eje fundamental del desarrollo sostenible y el Turismo de Naturaleza.





Carpintero
de los Robles

AGRADECIMIENTOS

Esta Guía de aves es el resultado del trabajo entre nuestras instituciones y fundamentalmente del Club de Avistadores del Nima de la I.E. Sagrada Familia Potrerillo, a sus integrantes y docentes acompañantes un reconocimiento especial por sus jornadas de avistamiento. De igual manera es el resultado de las jornadas de monitoreo realizadas en el marco del programa de turismo de naturaleza del Corredor Turístico del Nima entre la Fundación Smurfit Westrock y la Universidad Autónoma de Occidente. A la comunidad local del Nima gracias por permitirnos ser parte de este proceso de consolidar en esta zona rica ecosistémicamente la actividad del avistamiento de aves como una puesta en escena del potencial del turismo de naturaleza para la zona.

A la compañía Smurfit Westrock y su Fundación un agradecimiento especial por la financiación, acompañamiento y gestión desde su equipo técnico, profesional y directivo para hacer realidad esta obra que hoy constituye un insumo fundamental en la interpretación y educación ambiental en el proceso de empoderamiento local tanto de la comunidad estudiantil como de habitantes locales en el reconocimiento de su biodiversidad.

Finalmente queremos agradecer al profesor Gustavo Londoño de la Universidad Icesi por su apoyo desde la plataforma Wikiaves para mejorar el alcance de esta guía tomando a la plataforma como lugar de consulta y ampliación de la información.

Desde la Universidad Autónoma de Occidente mantendremos nuestro compromiso decidido por este proceso de desarrollo local sostenible a través de la educación, investigación, conservación y los negocios verdes a través del turismo sostenible.

A quienes nos siguen apoyando e invitando a caminar los senderos y veredas del Nima, muchas gracias.



Gavilán Caminero

USO DE LA GUÍA

Las especies e ilustraciones de la guía están organizadas por familias y el ordenamiento filogenético, los nombres científicos y los nombres en inglés de cada familia y especie se ajusta a las listas del Comité de Clasificación Suramericano o South American Classification Committee (Remsen et al., 2026). Por su parte, los nombres en español y la información concerniente a la identificación de especies, su comportamiento y hábitat se ajusta a la Guía de Aves de Hilty y Brown (2001), traducida al español por Humberto Álvarez.

La lectura de la guía empieza por una sección que corresponde al nombre en español de cada familia, su nombre científico y aspectos generales o información general. Posteriormente, en cada familia se muestran una o más especies, divididas por secciones con el nombre en español, el científico (latín), el nombre en inglés, las ilustraciones e información básica y específica para su identificación.

En algunas especies se muestran varias ilustraciones para tener pistas más claras en la identificación (vista frontal, lateral o dorsal; macho y hembra, juvenil). En especies como el Águila Variable (*Geranoaetus polyosoma*) y el Carpintero Marcial (*Campephilus melanoleucus*) se muestran especies muy similares que coinciden con el área de distribución geográfica y altitudinal y que pueden o están en el Corredor Turístico del Nima. En otras especies como el Bienparado Común (*Nyctibius griseus*) y el Carpintero Carmesí (*Colaptes rivolii*) se muestran diferentes posturas y coloraciones. Por su parte, en algunas especies de colibríes se ilustran aspectos relacionados con la iridiscencia, mientras que en el caso del Trogón Enmascarado se ilustra una subespecie situada en las zonas altas (*Trogon personatus temperatus*).

Los atributos relacionados con el tamaño de cada especie, descripciones y el rango de elevación medido en metros sobre el nivel del mar (msnm), fueron tomados o complementados de Ayerbe Quiñones (2018). Cada especie también tiene un código QR que remite al usuario al portal WikiAves donde se puede encontrar información más detallada con fotografías.

EJEMPLO

Información general de la familia -----

COLIBRÍES

•----- Familia: nombre en español

Trochilidae •----- Nombre taxonómico

Familia exclusiva del continente americano, siendo Colombia el país con más diversidad de especies de colibríes en el mundo. Se caracterizan por ser una de las aves más pequeñas del mundo, las que tienen menos plumas, las de metabolismo más acelerado, las de mayor aleteo (unos 80 por segundo) y ser nectarívoros. Muchas especies presentan plumajes iridiscentes, por lo que sus colores varían según el ángulo de incidencia de la luz e incluso parecer negros en condiciones de luz tenue, lo que hace difícil ver parches, gorgueras, supra e infracaudales.

Código QR a especie en wikiaves.com




Colibrí Collarejo

Florisuga mellivora

White-necked Jacobin

10 cm

Pico más bien corto y grueso. Cabeza, garganta y pecho azul lustroso. Medialuna blanca grande en nuca. Hembra verde bronceo encima con infracaudales oscuras escamadas de blanco. Solitarios, revolotean sobre ríos y árboles cazando insectos. Común en bordes de bosques húmedos, claros y áreas perturbadas.



Pico ligeramente decurvado en la punta

Especificaciones para la identificación

Juvenil

<2000 msnm

Descripción de aspectos morfológicos, comportamiento, de observación - avistamiento y de hábitat

Nombre en español
Nombre científico
Nombre en inglés
Tamaño

Rango altitudinal

En algunas especies se ilustra la etapa juvenil

Símbolos



Hembra



Macho



Migratoria Austral



Migratoria Boreal

Algunas especies muestran ilustraciones complementarias para la identificación



Amazilia Coliazul



Zafiro Cabeciazul

PAVAS Y GUACHARACAS

Cracidae

Familia más bien homogénea de galliformes. Tienen patas grandes y fuertes, picos como de gallina y predominantemente arbóreos. Se alimentan principalmente de frutas, semillas y brotes. Realizan vuelos cortos entre coberturas arbóreas y bordes de bosques. Las guacharacas son más esbeltas, con piel de la garganta desnuda y de color rojo (sin gola), andan más en el suelo que las pavas que son más robustas y de hábitos más arborícolas.



Pava Maraquera

Chamaepetes goudotii
Sickle-winged Guan
50-65 cm

Alas y cola con lustre verde con bajo pecho y abdomen contrastantes castaño rufo uniforme. Relativamente común, solitaria, en parejas o grupos de tres en bosques húmedos de montaña, bosques secundarios, bordes y fincas. De hábitos arbóreos en estratos medios y altos, ocasionalmente en suelo.

Extensa área loreal
y orbital azul brillante



Ausencia
de gola

800 – 3300 msnm



Pava Andina

Penelope montagnii
Andean Guan
50-60 cm

Área ocular desnuda azul opaco. Cabeza finamente estriada de blanco-grisáceo y pecho escamado del mismo color. Gula roja pequeña no siempre evidente. Garganta más emplumada que en mayoría de Penelope. Localmente común en bosques húmedos y secundarios de montaña, bordes y ecotonos bosque-páramo.

A veces con cresta



Cabeza
finamente
estriada
y pecho
escamado

A mayor elevación
que otras pavas

800 – 3300 msnm



Guacharaca Colombiana

Ortalis columbiana
Colombian Chachalaca
50-55 cm

Esbelta.

Cabeza gris pálido.

Conspicua, muy común y de vocalización estridente en bosques húmedos, secundarios, bordes, árboles dispersos, zonas de transición entre bioma húmedo y seco en piedemonte.

Cola larga café-grisácea
con rectrices externas rufas



Pecho y
parte anterior
del cuello de
color café
grisáceo
escamado
de blanco

Abdomen de color
blanco anteado

300 – 2000 msnm

PALOMAS, TORCAZAS Y TORTOLITAS

Columbidae

En Colombia hay especies terrestres y arborícolas en diferentes ecosistemas y hábitats. Son de vuelo rápido, con cabeza pequeña y pico débil. Con plumajes que exhiben tonos apagados u opacos de café a gris. El canto o arrullo difiere entre especies y suele ser muy útil en la identificación de especies, especialmente las más cripticas como las palomas-perdices.



Torcaza Collareja

Patagioenas fasciata
Band-tailed Pigeon
35 cm

Lustre verde-broncíneo metálico en alta espalda. Cola con banda central negra y banda blanca conspicua en vuelo. Común localmente en bosques húmedos de media y alta montaña, áreas con árboles dispersos y laderas muy empinadas.

Banda blanca conspicua
en nuca



Pico
amarillo

Cabeza y
partes
inferiores
gris-vináceo

Cola
cuadrada
y ancha

Grande, de cuerpo
robusto gris-pardusco

600 – 3500 msnm



Caminera Rabiblanca

Leptotila verreauxi
White-tipped Dove
28 cm

Frente y partes inferiores gris rosáceo pálido desvanecido a blanco en garganta, abdomen e infracaudales. Cobrteras alares internas rufo-canela. Terrestre, arisca, solitaria o en parejas. Común en matorrales o bordes, plantaciones y pastizales con sombra en zonas seca a húmedas.

Cola con anchos
ápices blancos



Por encima
café grisáceo

Sin gris-azul
en la coronilla

Línea loreal
y piel orbital
desnudas rojo

<2800 msnm



Torcaza Nagüiblanca

Zenaida auriculata
Eared Dove
26 cm

En vuelo rectrices externas con estrecha banda subterminal negra y ápices blancos. Muy común y gregaria en zonas secas, abiertas, agrícolas y urbanas.

Encima
oliva pardusco

2 Marcas negras
en lados de
la cabeza



Cabeza y
partes
inferiores
rosa-vináceo
uniforme

Punteado
de negro
conspicuo

Cola cuneada

<3500 msnm



Tortolita Común o Rojiza

Columbina talpacoti
Ruddy Ground Dove
18 cm

Rufo canela con partes inferiores más pálidas y coronilla contrastante gris clara. Hembra más café-rojizo. Muy común y gregaria en zonas secas y abiertas, cultivos, fincas, jardines y ciudades.



<2500 msnm

GARRAPATEROS Y CUCOS

Cuculidae

Familia homogénea de aves caracterizadas por cuerpos delgados y colas largas con cierta gradación y redondeada. De hábitos terrestres y arbóreos, se alimentan principalmente de insectos que complementan con pequeños vertebrados y huevos de otras aves.



Garrapatero Común

Crotophaga ani
Smooth-billed Ani
35 cm

Plumaje negro petrolizado (con cierto lustre). Muy común y conspicuo en zonas abiertas, potreros y zonas urbanas, de hábitos gregarios en árboles, arbustos, suelo y estructuras antrópicas.

Pico negruzco, delgado
y con prominencia en mitad
basal de mandíbula superior



Cola larga y
redondeada

<3000 msnm



Cuco Ardilla

Piaya cayana
Squirrel Cuckoo
50 cm

Por encima castaño. Cola muy larga y gradada. Común y más bien solitario en bosques secos y húmedos, bordes y áreas semi-abiertas. Salta entre ramas de forma parecida a las ardillas.

Pico y piel orbital desnuda
amarillo verdoso pálido



Negro en
abdomen e
infracaudales

Cola con grandes puntos terminales
blancos y redondos en las rectrices
(visibles desde abajo)

800 – 3300 msnm

BIENPARADOS

Nyctibiidae

Aves solitarias y nocturnas, principalmente insectívoros que cazan al vuelo desde una percha. Presentan plumaje críptico con postura inmóvil durante el día que los hace muy difíciles de detectar. Suelen percharse en ramas desnudas, en postes y a final de troncos quebrados o tocones. Vocalizaciones consideradas como fantasmagóricas.




Bienparado Común

Nyctibius griseus

Common Potoo

38 cm

Café grisáceo a café oscuro moteado, estriado y vermiculado en todo el cuerpo con canela, gris y negro. Coloración variable. Ojos amarillos aunque de noche reflejan ámbar o naranja.



<2600 msnm

COLIBRÍES

Trochilidae

Familia exclusiva del continente americano, siendo Colombia el país con más diversidad de especies de colibríes en el mundo. Son unas de las aves más pequeñas del mundo, las que tienen menos plumas, las de metabolismo más acelerado, las de mayor aleteo (unos 80 por segundo) y ser nectarívoros. Muchas especies presentan plumajes iridiscentes, por lo que sus colores varían según el ángulo de incidencia de la luz e incluso parecer negros en condiciones de luz tenue, lo que hace difícil ver parches, gorgueras, supra e infracaudales.



Colibrí Collarejo

Florisuga mellivora

White-necked Jacobin

10 cm

Pico más bien corto y grueso. Cabeza, garganta y pecho azul lustroso. Medialuna blanca grande en nuca. Hembra verde bronceo encima con infracaudales oscuras escamadas de blanco. Solitarios, revolotean sobre ríos y árboles cazando insectos. Común en bordes de bosques húmedos, claros y áreas perturbadas.

Garganta y pecho oscuro-verdoso escamado de blanco



Pico ligeramente decurvado en la punta

Juvenil


<2000 msnm



Ermitaño Verde

Phaethornis guy
Green Hermit
12.5 cm

Pico muy largo decurvado con mandíbula inferior principalmente roja. Verde oscuro. Hembra con partes inferiores más grises y rectrices centrales a veces más largas. Forma leks. Ruterio. Común y local en bosques húmedos de piedemontes y la baja montaña.



600 – 2200 msnm



Chillón Pardo

Colibri delphinae
Brown Violetear
10.5 cm

Pico relativamente corto. Colibrí de color café tenue-blancuzco con parche conspicuo de barrado rufo en rabadilla. Garganta verde iridiscente a opaco. Raro, errático y estacional en bosques húmedos, bordes, claros, matorrales y zonas agrícolas con árboles. Caza insectos al aire.

Auriculares
violeta iridiscente



Cola bronce-verdoso opaco con banda subterminal café-oscuro.

600 – 2600 msnm



Chillón Verde

Colibri coruscans
Sparkling Violetear
13 cm

Pico casi recto. Verde brillante con un estrecho parche azul violeta iridiscente desde debajo del pico hasta detrás de la región auricular y otro grande desde el centro del pecho hasta el abdomen. Común en media y alta montaña, en bordes de bosque, potreros con árboles y jardines.

Conspicuo, común, vocal, agresivo y muy territorial



Parches
azul
violeta
iridiscente

Cola verde azulada


1200 – 3600 msnm



Manguito Pechinegro

Anthracothorax nigricollis
Black-throated Mango
10.5 cm

Pico levemente decurvado. Hembra inconfundible por su lista negra contrastante en blanco. Localmente común en bordes de bosque, áreas con intervención antrópica, árboles frutales y jardines de zonas secas a húmedas.



Lista negra con bordes azul intenso

Cola más purpurea con ápice negro

Cola más rufa con banda subterminal negruzca y ápice blanco

<2600 msnm



Heliángelus Belicoso

Heliangelus exortis
Tourmaline Sunangel
9.5 cm

Pico corto y recto. Encima verde brillante con negro purpureo. Pecho verde iridiscente. Hembra presenta garganta blanca (no rosa). Común, conspicuo y muy territorial. Forrajea a baja altura en bordes de bosque, matorrales con o sin pastizales. Alas en abiertas en V mientras liba colgado.

Gorguera azul violeta iridiscente Frente verde iridiscente



Parche rosa grande iridiscente

Infracaudales blancas

Cola larga ahorquillada

2000 – 3200 msnm



Colibrí Pechipunteado

Adelomyia melanogenys
Speckled Hummingbird
8.8 cm

Pico corto y recto. Pecho color ante parduzco. Sexos similares. Solitario, ocasionalmente en parejas. Común en estratos bajos y bordes sombreados en bosques y bordes húmedos de la media montaña.

Mejillas negruzcas Franja postocular blanca



Garganta con puntos oscuros

Pecho punteado de verde iridiscente

Cola con ápice ante

1000 – 3000 msnm




Silfo Coliverde

Agelaiocercus kingii

Long-tailed Sylph

♂ 18 cm ♀ 10 cm

Pico corto. Lista central verde iridiscente en la coronilla. Cola larga verde azul-metálico brillante encima, oscura en superficie ventral (en juveniles es más corta). Hembra con garganta blanca ligeramente punteada con verde sin cola larga como el macho. Común en bordes de bosques húmedos, bosques secundarios y jardines.



Pecho y abdomen color canela

Cola con ápices blancos ahorquillada

Juvenil

Cola abierta

1600 – 3000 msnm



Cometa Coliverde


Lesbia nuna

Green-tailed Trainbearer

♂ 18 cm ♀ 11 cm

Pico muy corto, delgado y recto. Plumaje verde esmeralda brillante. Hembra densamente punteada de verde sobre fondo blanco en garganta, pecho y abdomen; con cola como la del macho pero más corta. Activo y agresivo. No es muy común y suele encontrarse en bosques secundarios, bordes de bosque con matorrales y pastizales.

Punto postocular blanco



Gorguera iridiscente

Juvenil

Cola larga y estrecha, verde alternada con negro contrastante, usualmente cerrada

2000 – 3900 msnm



Metalura Colirrojo


Metallura tyrianthina

Tyrian Metaltail

8 cm

Pico corto. Verde cobrizo oscuro. Hembra con mejillas, garganta y alto pecho leonado con algunos puntos oscuros, flancos punteados de verde oscuro, cola con ápice blanco anteado. Agresivo y territorial. Común y abundante en bordes de bosques húmedos, áreas de ecotonos de bosque altoandino-páramo o parches de arbustos en páramo.

Gorguera verde iridiscente



Punto postocular blanco

Ápice blanco anteado

Cola rufa-cobriza brillante

2100 – 3500 msnm



**Paramero
Rabihorcado**

Eriocnemis derbyi
Black-thighed Puffleg
9 cm

Pico recto y largo. Único paramero con plumones tibiales (calzoncitos) negros, no siempre conspicuo. Hembra con punto postocular blanco, partes inferiores blancas densamente punteadas con discos verdes, plumones tibiales blanco y negro. Poco común y local en borde de bosque, matorrales, ecotonos de páramo y cañadas.

Supra-caudales
verde iridiscente



Cola negra, aguda
y ahorquillada

Infracaudales
verde
iridiscente

2600 – 3700 msnm



**Paramero
Áureo**

Eriocnemis mosquera
Golden-breasted Puffleg
11.7 cm

Pico recto. Infracaudales pardusco opaco. Cola negra de tonos verdes (más verdosa que otros parameros). Solitario, activo y agresivo. Poco común, local, en bosques, bordes, matorrales y ecotonos por debajo del páramo.

Plumones
tibiales blancos Encima verde
brillante



Verde cobrizo
iridiscente en
lados del
cuello, pecho
y vientre

Cola ahorquillada

2500 – 3600 msnm



**Colibrí
Paramuno**

Aglaeactis cupripennis
Shinning Sunbeam
11.4 cm

Pico recto. Rufo-canela. Coronilla y centro de espalda oliva negruzco. Hembra es más opaca y con parche iridiscente más pequeño. Común en bordes de bosque, bosques y ecotonos páramo-bosque andino. Conspicuo, agresivo y territorial

Único colibrí rufo-canela
en su areal



Parche violeta-rosa iridiscente
en baja espalda y verde-dorado
en rabadilla

2600 – 3700 msnm




Inca Collarejo

Coeligena torquata

Collared Inca

11.4 cm

Pico largo, recto y delgado. Casi todo negro o verde negruzco con extensa banda pectoral triangular blanca. Hembra es verde brillante, alta garganta con puntos verdes sin parche en coronilla. Rutero activo y silencioso que participa en bandadas mixtas. Común en bosques húmedos.



Abdomen gris con discos verdes

Punto azul a violeta iridiscente

1600 – 3000 msnm



Colibrí Chupasavia


Boissonneaua flavescens

Buff-tailed Coronet

10.7 cm

Pico recto y grueso. Espalda y pecho verde brillante. Abdomen ante densamente punteado con discos verdes (hembra es hasta la garganta). Coberturas alares internas ante-canela (conspicuas en vuelo). Cola con parche lateral color crema. Territorial. Común en bosques húmedos.

Sexos muy similares



Mancha ante a beige en hombro

Coronilla y gorguera verde iridiscente

1400 – 3000 msnm




Heliodoxa Leonado

Heliodoxa rubinoides

Fawn-breasted Brilliant

10.6 cm

Pico largo ligeramente decurvado. Espalda verde brillante. Pecho y vientre ante-canela. Cola verde cobriza y ancha. Hembra similar pero sin parche rosa en baja garganta. Común a localmente común, solitario en bosques húmedos y nublados.



Garganta y lados del pecho con discos verdes

Pequeño parche rosa iridiscente

1400 – 2600 msnm




Colibrí de Bufón

Chalybura buffonii
White-vented Plumeleteer
11 cm

Pico negro moderadamente largo y decurvado. Cola negro-azul. Solitario o en pares. Común en bosques húmedos abiertos, secundarios, bordes de bosque en tierras bajas, piedemontes y montañas a baja elevación.

Verde brillante encima



Verde iridiscente debajo

Infracaudales largas, blancas y sedosas

Ápice blanco

<1800 msnm



Amazilia Coliazul

Saucerottia saucerottei
Steely-vented Hummingbird
8.7 cm

Pico casi recto, mandíbula inferior rosa con ápice oscuro. Encima verde brillante, debajo verde iridiscente. Supracaudales bronce-cobrizo. Muy común en zonas secas y húmedas, incluyendo bosques, bordes, jardines y cultivos.

Leve dimorfismo sexual



Infracaudales escamadas bronce a grisáceo con márgenes blancos

Cola azul-acero ahorquillada

Garganta, pecho y abdomen verde iridiscente



2500 – 3600 msnm



Amazilia Colirrufo

Amazilia tzacati
Rufous-tailed Hummingbird
9 cm

Pico casi recto, mandíbula inferior rosa (a veces también la superior) con ápice oscuro. Encima verde. Hembra con plumas de pecho y garganta marginadas ante a gris. Muy común en zonas secas y húmedas, incluyendo bosques, bordes, jardines y cultivos, incluso zonas urbanas.

Garganta y pecho verde iridiscente



Cola castaño-rufo ahorquillada

<1900 msnm



**Amazilia
Andino**

Uranomitra franciae
Andean Emerald
9 cm

Pico casi recto, mandíbula inferior rosa con ápice oscuro. Partes inferiores totalmente blanco inmaculado con lados y flancos verdes. Supracaudales cobrizas. Común, solitario y rutero en bordes de bosques húmedos, secundarios y claros con árboles.



Coronilla azul-violeta iridiscente (macho)



Lados de cabeza y cuello verde iridiscente

1000 – 2100 msnm




**Zafiro
Cabeciazul**

Chrysuronia grayi
Blue-headed Sapphire
9 cm

Pico casi recto y rojo coral con ápice negro. Verde brillante con partes inferiores más iriscentes. Hembra con pico más opaco; verde brillante encima, lados verdes y casi toda blanca por debajo con discos verdes iriscentes con apariencia punteada en garganta y pecho; cola con ápice blanquecino. Localmente común en zonas secas y semi-secas, bosques secundarios, cultivos, jardines y matorrales. Agresivo y errante en la mayoría de áreas con marcados movimientos estacionales.

Cabeza y alta garganta azul iridiscente



Cola negro-azul levemente ahorquillada

2000 – 3400 msnm

IBIS

Threskiornithidae

Familia de vadeadoras de patas largas que resaltan por sus picos largos delgados y decurvados en forma de hoz, piel facial desnuda que vuelan con el cuello estirado en formación en V o en línea. Además, exploran con el pico fango suave en busca de crustáceos, insectos y otras pequeñas presas. Los nidos son plataformas de chamizas o ramas secas.



Ibis Coquito

Phimosus infuscatus
Bare-faced Ibis
55 cm

Plumaje enteramente negro-verdoso bronceo (puede lucir negro en condiciones de poca luz). Muy común, por lo general en grupos explorando terrenos blandos asociados a orillas de ríos, humedales o cultivos

Pico decurvado rosa a café-rojizo. Piel facial desnuda rojo-rosa



Patas rojo-rosa

<2600 msnm



Coclí

Theristicus caudatus
Buff-necked Ibis
75 cm

Piel facial desnuda negra. Vientre y cola negro. Grupos laxos o individuos solitarios en terreno abierto con campos de gramíneas húmedos. Percha frecuentemente en palmas.

Alas negras con coberteras superiores blanco-platinado conspicuas en vuelo



Cabeza, cuello y pecho ante-cremoso pálido, teñido de orín en coronilla y pecho.

Patas rojo-rosa

<3000 msnm

GALLINAZOS

Cathartidae

Familia de aves principalmente carroñeras, de cabeza desnuda, narinas perforadas, picos y patas relativamente débiles. Olfato y visión muy desarrollados. Vuelan largas distancias buscando alimento y remontan usando corrientes de aire (térmicas).



Gallinazo Común

Coragyps atratus
Black Vulture
65 cm

Parche blanquecino en base de primarias conspicuo en vuelo desde abajo. Remonta con alas planas (no en ángulo) y vuelo sin vaivén. Muy común en áreas pobladas y terreno abierto, casi ausente en zonas boscosas extensas.

Todo de negro con piel facial y cuello desnudos



Nota: la guala es muy similar pero con cabeza roja y alas con dos tonos (vistas desde abajo): uno gris pálido (rérmiges) que contrasta con otro oscuro (coberteras internas).

<4000 msnm

ÁGUILAS Y GAVILANES

Accipitridae

Rapaces diurnas, carnívoras con pico fuerte y ganchudo, patas también fuertes para capturar y sujetar presas. Una misma especie puede presentar diferentes morfos o fases como es el caso de *Geranoaetus polysoma* y *G. albicaudatus* en menor medida. Tamaño, forma y colores-patrones de las alas desde abajo, así como el vuelo pueden ser buenos rasgos para distinguir especies.



Gavilán Caminero

Rupornis magnirostris
Roadside Hawk
33-40 cm

Partes superiores, garganta y pecho gris pardusco, resto de partes inferiores densamente barrado canela y blanco. Cola pardusca con 4-5 bandas grises. La rapaz más común en Colombia, en bosques secos a húmedos, orillas de ríos, rastrojos o áreas abiertas con árboles.

Parche rufo en base de primarias (conspicuo en vuelo)



Ojos amarillos

Barrado denso canela y blanco

<2700 msnm




Águila
Variable MA

Geranoaetus polyosoma
Variable Hawk
45-60 cm

Grande y muy variable, con al menos 5 fases. Adultos tienen cola blanca o casi blanca con amplia banda subterminal negra. Hembras con espalda rufa, por lo general. Poco común, en pendientes abiertas en montañas. Vista en Amberes (Corredor Turístico del Nima).

Puede confundirse con Águila Coliblanca (*Geranoaetus albicaudatus*).

G. polyosoma Espalda rufa



G. albicaudatus
Hombros rufos
conspicuos

Alas largas se
extienden
más allá de
la cola
(perchada)

2000 – 4000 msnm



Águila
Paramuna

Geranoaetus melanoleucus
Black-chested
Buzzard-Eagle
60-75 cm

Grande y robusta. Alas largas y muy anchas. Cara y patas amarillas. Partes superiores negro-pizarra con hombros gris-pálido. Garganta gris-claro que pasa gradualmente a pizarra en pecho. Local en bosques húmedos, páramos, ecotonos y zonas abiertas. Posa en rocas, escarpes, suelo y frailejones (*Espeletia* sp).

G. polyosoma



Cola corta, cuneada, en vuelo escasamente se proyecta más allá de las alas

Juvenil



1600 – 3500 msnm

TROGONES

Trogonidae

Los trogones se caracterizan por los colores llamativos, lustrosos y contrastantes, de postura erguida, además de sus colas fuertemente grabadas y sus rectrices cuadradas, pies con dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás. Insectívoros y frugívoros. Anidan en cavidades naturales como troncos huecos. Realizan vuelos cortos para capturar insectos o agarrar frutas.



Trogón Collarejo

Trogon collaris
Collared Trogon
25 cm

Marcado dimorfismo sexual. Ambos con banda pectoral blanca, resto del pecho y abdomen de rojo (en la hembra es más tenue tirando a rosa). Macho con tenue anillo ocular rojo-naranja y pico amarillento. Común en bosque húmedo, monte secundario y bordes. Solitario o en parejas.

Mandíbula superior oscura



3 Bandas blancas

Cola rufa finamente vermiculada de blanco y negro

Cola negra con estrecho barrado blanco

<2500 msnm



Trogón Enmascarado

Trogon personatus
Masked Trogon
25 cm

Encima y en pecho verde lustroso oscuro. Macho con cabeza y rabadilla teñida de azulado con barras onduladas mucho más finas o ápices blancos más anchos con barrado blanco casi inexistente en la subespecie *temperatus*. Solitario o en parejas. Común en bosque húmedo, monte secundario y bordes, por lo general en estrato medio o más bajo.

Nota: muy similar a *T. collaris* pero las colas son distintas. En *T. personatus* la máscara es más negra y definida, con vermiculado mucho más fino en hombros; en la hembra el pico completamente amarillo.

T. personatus temperatus

Trogón de tierras altas
>2700 msnm



Cabeza azulada

Pico amarillo

Barrado casi inexistente

Encima: cola rufa

T. personatus personatus

Trogón de Media Montaña de la Cordillera Central <2700 msnm



Cabeza verdosa

Vermiculado muy fino

Fino barrado negro y blanco

1300 – 3000 msnm

BARRANQUEROS

Momotidae

Los barranqueros se reconocen por sus colas largas terminadas en raquetas y que mueven como péndulos. Estas raquetas se originan por el acicalamiento o abrasión de las plumas y no siempre se ven individuos con raquetas, a veces incluso con una sola. Son omnívoros, se alimentan de fruta, invertebrados y pequeños vertebrados. Suelen anidar en barrancos, de ahí su nombre.



Barranquero Andino

Momotus aequatorialis

Andean Motmot

48 cm

El canto y la silueta lo hacen inconfundible, incluso sin raquetas. Ojos rojos. Máscara ocular negra. Encima es de color verde intenso y por debajo tiene tonos verdes oliva con canela. Solitario y en parejas en estrato medio y bajo de árboles, ocasionalmente en el suelo. Se posa estático, a veces pasando desapercibido. Común en bordes de bosques húmedos, secundarios, de galería, cultivos y parches boscosos.

Coronilla negra circundada por una banda turquesa o azul eléctrico



Punto oblongo en pecho

Único Barranquero en el C.T Nima

No siempre exhiben raquetas o colas largas

1300 – 3000 msnm

TORITOS

Capitonidae

Aves robustas con cuello corto, patas cortas y picos grandes rodeados por prominentes cerdas rictales. En Colombia son coloridos y habitan en bosques húmedos donde se alimentan principalmente de frutas e insectos. En la zona montañosa de los Andes colombianos únicamente se encuentra el Torito Cabecirrojo.




Torito Cabecirrojo

Eubucco bourcierii

Red-headed Barbet

15.5 cm

Pico amarillo. Pequeña de espalda verde. Hembra y macho muy disimiles. Hembra sin rojo terciopelo, con azul en rostro y con estrecha línea amarilla. Macho con banda blanca en la nuca. Vocalizan muy poco. Común en bosques húmedos, secundarios y bordes. Usualmente en parejas pero pueden formar grupos y seguir bandadas mixtas.



Único torito en el C.T Nima

Marcado dimorfismo sexual



900 – 2500 msnm

TUCANES

Ramphastidae

Aves características por sus icónicos picos que son grandes, livianos y con borde interior aserrado, coloración llamativa y lenguas largas en forma de pluma. Pueden doblar la cola y aplanarla sobre la espalda. Área ocular desnuda. Son omnívoras, aunque principalmente frugívoras, cazan vertebrados e invertebrados, depredan huevos, polluelos e incluso otras aves. Suelen verse solitarios, en parejas o en grupos pequeños.



Tucancito Esmeralda

Aulacorhynchus albivitta
Southern Emerald Toucanet
31-37 cm

Verde brillante, más pálido debajo con área ocular azul. Uno de los tucanes más pequeños de Colombia (si no es el más). Común en bosques húmedos, secundarios y bordes. Activo, ruidoso y a veces curioso. Similar a *A. haematopygus*.

Pico negro con amarillo en mandíbula superior



Blanco en garganta

Colores de picos es la mejor marca para distinguir *A. albivitta* de *haematopygus*

Abdomen rojo

<2500 msnm



Tucancito Rabirrojo

Aulacorhynchus haematopygus
Crimson-rumped Toucanet
40-45 cm

Verde casi todo. Activo, ruidoso y a veces curioso. Común en bosques húmedos, secundarios, bordes y zonas de cultivo con árboles. Se traslapa con *A. albivitta* aunque por lo general está a una menos elevación.

Pico rojo oscuro con negro



Parche malar y banda pectoral difusa azul (poco conspicuos)

Ápice de rectrices castaño

Rabadilla roja

Azul difuso

600 – 2200 msnm



Terlaque Andino

Andigena hypoglauca
Grey-breasted
Mountain-Toucan
46 cm

Coronilla, nuca y lados de la cabeza negros. Café-oliváceo por encima. Plumaje laxo, casi como pelo. Solitario, en parejas o pequeños grupos, por lo general en dosel, rara vez en suelo. Poco común y local en bosques húmedos, bordes, bosques altoandinos y ecotonos bosque-páramo. Muy vocal.

Nota: similar a *A. nigrirostris*, que posiblemente también este en el Corredor Turístico del Nima

Pico colorido



Amplio collar completo y pecho gris-azul

Abdomen rojo

Cola negruzca con ápice castaño

Rabadilla amarilla

2000 – 3500 msnm

CARPINTEROS

Picidae

Familia conocida por hábil uso de sus picos como cinceles para penetrar la corteza de árboles en busca de insectos o para excavar agujeros donde anidan. Suelen sujetarse en troncos o ramas apoyados en sus colas con plumas caudales fuertes, rígidas y aguzadas (excepto *Picumnus*). Habitan en zonas con árboles, frugívoros e insectívoros con vuelo ondulante caracterizado por un par de aleteos seguidos de un breve planeo. Lengua con barbas en el extremo que puede extenderse para capturar insectos (especialmente hormigas y termitas) entre la madera y la corteza.



Carpintero de los Robles

Melanerpes formicivorus
Acorn Woodpecker
23 cm

Patrón facial de payaso. Conspicuo y activo, en parejas o grupos ruidosos, usualmente en árboles secos, altos y de robles (*Quercus*). Común en bordes de bosque húmedo, áreas deforestadas con árboles dispersos.

Sin banda escarlata en occipucio



1400 – 2700 msnm




Carpintero Habado

Melanerpes rubicapillus
Red-crowned Woodpecker
18 cm

Rabadilla blanca. Inferior y parte de cabeza gris anteado. Centro del abdomen rojo. Común, conspicuo, solitario y de áreas abiertas. Estrato medio o más bajo de matorrales, bosques secos, transiciones a bosques húmedos y zonas con cultivos.

Coronilla y occipucio rojos



Solo el occipucio es rojo

Barrado negro y blanco

1400 – 2700 msnm



Carpintero Marcial

Campephilus melanoleucos
Crimson-crested Woodpecker
35 cm

Carpintero grande. Listas blancas contrastantes en negro que van de los lados del cuello hasta la espalda y convergen formando una “V” (marca propia de *Campephilus*). Garganta negra, pecho y abdomen barrado negro y ante-beige. Parejas o en grupos, desde el suelo hasta el subdosel. Común en bosques húmedos, secundarios, bordes y ocasionalmente árboles aislados.

Muy similar al Carpintero Real (*Dryocopus lineatus*); ver cabezas y marca en V de espalda.



Cabeza roja brillante con punto negro y blanco y con parche blancuzco en la base del pico.



D. lineatus

1400 – 3000 msnm




**Carpintero
Cariblanco**

Colaptes rubiginosus
Golden-olive Woodpecker
23 cm

Rabadilla amarilla barrada de oliva. Lados de la cabeza blancos bordeados con bigote rojo (macho) o negro (hembra). Garganta de negro sólido. Pecho y abdomen con bandas oliva oscuro y amarillo pálido. Común, solitario o en parejas en estrato medio hasta dosel de bosques montanos, secundarios, árboles dispersos en claros y ciudades como Cali.

Similar a *Colaptes punctigula*.

Coronilla y occipucio carmesí



Espalda
verde oliva
dorado

♀ Frente negruzca,
bigote negro

900 – 3000 msnm



**Carpintero
Carmesí**


Colaptes rivolii
**Crimson-mantled
Woodpecker**
26 cm

Rabadilla amarillenta barrada de negro. Lados de la cabeza blancuzcos con bigote carmesí (macho) o negro (hembra). Garganta y alto pecho negros escamados de blanco o a veces garganta negra con pecho teñido de rojo. Pecho y abdomen amarillo-dorado punteado de negro a los lados. Común en bosque húmedo, bordes, claros con árboles, bosques de transición a páramos (orobioma Alto de Los Andes). Solitario, en parejas y acompañando bandadas mixtas.

Coronilla y espalda carmesí



Cola
negra



En árboles
con abundante
musgo
y epífitas

♂ Bigote
carmesí


1500 – 3500 msnm



Carpintero Buchipecoso

Colaptes punctigula
Spot-breasted Woodpecker
20 cm

Lados de la cabeza blancos, hembra sin bigote rojo. Pecho amarillo-oliva y abdomen con amarillo más claro, con puntos dispersos que van hasta los lados. Común en áreas abiertas, bordes, áreas cultivadas con árboles dispersos y ciudades como Cali. En estratos medios y bajos.



Frente negra, coronilla roja



Bigote rojo

Espalda amarillo-oliva barrada de negro



Garganta manchada de negro y blanco

<1800 msnm

HALCONES

Falconidae

Rapaces y oportunistas parecidas a especies de Accipitridae pero con diferencias morfológicas y evolutivas. Los Guaraguacos (Caracaras) son omnívoros y carroñeros, mientras que el Cernícalo Americano caza en vuelo, de figura aerodinámica y alas agudas que alcanza grandes velocidades.



Guaraguaco Común

Caracara plancus
Crested Caracara
50-60 cm

Manto barrado de blanco y negro. Rabadilla y cola blanquecinas. En vuelo muestra parches blancos en primarias externas. Conspicua en zonas ganaderas, a menudo en el suelo y roban presas. Común en zonas secas, en parejas o grupos.



Coronilla negra con cresta hirsuta

Piel facial desnuda y base del pico rojo-naranja

Pecho blanco barrado de negro

<3300 msnm



Guaraguaco Paramuno

Phalcoboenus carunculatus
Carunculated Caracara
50–55 cm

Pico y patas amarillos. Piel facial desnuda y arrugada. Cresta ensortijada. Poco común en zonas abiertas de páramos y otros ecosistemas altoandinos. Solitarios y ocasionalmente en parejas o en grupos. Muy terrestres y remontan cuando vuelan.

Garganta rojo-naranja



Principalmente negro con pecho estriado de blanco

Alas largas

Extremo de cola blanco

Cola larga y redondeada

2500 – 4000 msnm



Pigua

Milvago chimachima
Yellow-headed Caracara
40–45 cm

Pico y patas débiles. En vuelo grandes parches blanquecinos en base de primarias externas. Muy común y conspicua en zonas abiertas, agrícolas, ganaderas y urbanas

Amarillo en rostro



Cabeza, cuello y partes inferiores blanco-crema

Encima café negruzco con numerosas barras onduladas oscuras

Cola y alas largas



Juvenil

< 2700 msnm



Cernícalo Americano

Falco sparverius
American Krestel
30 cm

Patrón facial distintivo. Hembra de. Común en zonas abiertas: pastizales, orillas de carreteras, claros de bosques, bordes de bosques y zonas urbanas. Solitario o en parejas macho y hembra.



Colores más tenues y menor contraste.

Estriado en espalda y pecho



< 3200 msnm

PSITÁCIDOS

Psittacidae

Familia de guacamayas, loros, cotorras, pericos y periquitos según tamaño, extensión de cola, alas y pico. La mayoría son muy conspicuas, ruidosas y predominantemente verdes con patas prensoras y pico muy fuerte en forma de gancho. Son gregarias, se alimentan de semillas, frutos y flores. Muchas muestran preferencias por las palmas para alimentación o anidamiento.



Cotorra Cabeciazul
Pionus menstruus
Blue-headed Parrot
26 cm

Área ocular desnuda blanquecina. En vuelo se distingue por aleteo profundo. Muy común en bosques húmedos y transición a secos, bosques secundarios, claros con árboles dispersos y zonas urbanas.

Cabeza, cuello y pecho azul Pico oscuro con base rosácea



Auriculares negras

Parche rosáceo en pecho: *P. menstruus rubigularis*

Infracaudales rojas

< 2000 msnm



Cotorra Maicera
Pionus chalcopterus
Bronze-winged Parrot
28.5 cm

Anillo ocular desnudo ante. Espalda verde broncea. En vuelo: primarias y coberteras alares internas azul ultramarino intenso. Común a local en bordes y selvas húmedas de montaña. Vuelo y habito como *P. menstruus*.

Predomina color azul pardusco oscuro (casi negro)



Anillo ocular desnudo ante

Pico amarillento

Garganta con parche blancuzco

Alas bronce pardusco

Infracaudales rojas

500 – 2500 msnm



**Lora
Cabeciamarilla**

Amazona ochrocephala
Yellow-crowned Parrot
35-38 cm

Rémiges con ápice azul. Pequeña extensión roja en base de la cola. Relativamente común en bosques secos abiertos, bordes de bosques húmedos y zonas urbanas.

Hombro y parche
en secundarias rojos



Coronilla
y frente
amarilla

Pico pálido
con extremo
oscuro

<1500 msnm



**Periquito
de Anteojos**

Forpus conspicillatus
Spectacled Parrotlet
12.5 cm

Pico marfil. Hembra sin azul y verde esmeralda más brillante. Común, en parejas o bandadas en zonas secas y húmedas, bordes de bosque, cultivos, parches de bosque, claros con árboles y zonas urbanas.

Azul en región ocular,
coberteras alares y rabadilla



Pecho
verde
amarillo

< 2600 msnm



**Guacamaya
Cariseca**

Ara severus
Chestnut-fronted Macaw
50 cm

Pico negro-grisáceo. Principalmente verde con coronilla teñida de azul y frente castaño, estrecha e inconspicua. Piel facial desnuda blanquecina. Rémiges azuladas. Superficie inferior de la cola rojo opaco. Muy común en tierras bajas húmedas y en el Valle geográfico del río Cauca, en zonas boscosas, bordes, claros o cultivos y zonas urbanas.



Rojo en
interior
de las alas

Única
Guacamaya
en el Corredor
Turístico
del Nima

<1100 msnm



Perico Paramuno

Leptosittaca branickii
Golden-plumed Parakeet
35 cm

Anillo ocular desnudo blanco. Ancha banda difusa a través del bajo pecho amarilla difuminada con escamado naranja-rojizo. Raro a localmente común en bandadas en bosques altos del orobioma Medio y Alto de Los Andes, bosques y matorrales altoandinos en ecotonos bosque-páramo.



Bridas y línea postocular amarilla

Frente estrecha naranja

Azul en rémiges primarias

Cola larga y aguda rojizo-opaca en zona interior

1800 – 3500 msnm

FURNARIOS

Furnariidae

Familia principalmente insectívora de coloración marcada por tonalidades cafés y diferentes hábitos que incluye a Trepatroncos, Corretroncos, Hojarasqueros, Horneros y Rastrojeros. Son aves propias de bosques y matorrales. La forma del pico, los patrones de coloración en pecho, el canto, el hábitat y el estrato son fundamentales en la identificación de especies. Los trepadores (Trepatroncos y Corretroncos) presentan rectrices rígidas que les sirven de soporte para trepar.



Trepatroncos Cordillerano

Dendrocincia tyrannina
Tyrannine Woodcreeper
25 cm

Pico negruzco. Principalmente café con alas y cola castaño-rufo. Garganta de tono café más claro. Sin marcas o patrones de coloración marcados que sean muy evidentes. Solitario en estrato medio del bosque. Raro a poco común y local en bosque húmedo de montaña.



Pico como de Atrapamoscas

Plumaje más bien uniforme y sencillo respecto a otros Trepatroncos

1600 – 3300 msnm



Trepatroncos Cacao

Xiphorhynchus susurrans
Cocoa Woodcreeper
24 cm

Pico largo, robusto y ligeramente decurvado, negruzco encima y de tono beige por debajo. Coronilla negruzca con puntos ante en forma de gota. Garganta de color ante-beige. Abdomen de tono más claro que espalda y pecho. Común en bosques húmedos y transicionales a secos en piedemontes y tierras bajas.



Alas, rabadilla y cola castaño-rufo

<1700 msnm

Alto pecho y lados con estrías anchas color ante a beige delineadas de negro, casi en forma de gota.



Trepatroncos Campestre

Lepidocolaptes souleyetii
Streak-headed Woodcreeper
19.5 cm

Pico delgado y levemente decurvado. Coronilla y nuca café-negruzco con finas estrías de blanco-ante. Garganta ante. Solitario en estrato bajo y medio. Común en montañas y piedemontes secos y transición a húmedos, en bosque secundario abierto, bordes, parches boscosos y claros con árboles dispersos.

Pecho hasta bajo abdomen con listas anchas blancas delineadas de café-oscuro



Espalda café-rufo uniforme

Alas, rabadilla y cola rufa

<1400 msnm



Trepatroncos Montañero

Lepidocolaptes lacrymiger
Montane Woodcreeper
19 cm

Pico delgado y levemente decurvado. Coronilla y nuca café oscuro punteado de ante. Espalda café-rufo uniforme. Lista ocular blanca. Garganta blanco-ante. Solitario, en parejas o en bandadas mixtas, en estrato bajo a alto, principalmente el estrato medio y subdosel. Común en bosques húmedos. Al igual que el *L. souleyetii*, suele trepar por debajo de ramas horizontales.



Alas, rabadilla y cola castaño-rufo

1500 – 3300 msnm

Lados de la cabeza, pecho y abdomen café con amplias estrías blancas en forma de gota (*L. lacrymiger sneiderni*), nitidamente delineadas de negro.



Xenops Estriado

Xenops rutilans
Streaked Xenops
12 cm

Pico corto, con mandíbula inferior recurvada en ápice. Café por encima con coronilla más oscura y con estriado ante-claro. Garganta blancuzca. Solitario, en parejas, tríos o bandadas mixtas en estrato medio-bajo hasta el dosel. Común en bordes y bosques húmedos de montaña. Recorre ramas delgadas sin follaje y lianas, colgado o moviéndose de lado.



Cola rufa

1500 – 3000 msnm

Superciliar blanco-anteado, área malar blanca (bigotera en forma de medialuna)

Pecho hasta bajo abdomen café-oliva estriado de blanco-ante



Corretrancos Perlado

Margarornis squamiger
Pearled Treerunner
15.5 cm

Pico corto. Coronilla café con superciliar y garganta blancas. Bajo pecho y abdomen de color castaño-rufo intenso. Cola con raquis desnudos en su ápice. Solitario, en parejas, pequeños grupos y en bandadas mixtas. Activo pero poco conspicuo en estrato medio a dosel. Común en bosques húmedos del Oroboma Medio y Alto de los Andes, matorrales y parches boscosos cerca al páramo (ecotonos de bosque-páramo). Afinidad por árboles con epifitas.



1500 – 3500 msnm

Lados del cuello, pecho y abdomen café-oliva densamente marcados con manchas blanco crema en forma de gotas delineadas de negro.

ATRAPAMOSCAS

Tyrannidae

Familia de aves omnívoras compuesta por varias especies asociadas a diferentes hábitats, estratos y formas de obtención de alimentos, principalmente caza con vuelos cortos y espigueo. Es la familia con mayor riqueza específica de Colombia. Los Atrapamoscas o “Tiránidos” se pueden distinguir fácilmente por su silueta y comportamiento. No obstante, suelen ser un reto para la identificación de especies en campo por lo que se recomienda estudiar bien los distintos géneros.



Espatulilla Común

Todirostrum cinereum
Common Tody-Flycatcher
9.5 cm

Pico negro plano. Gris-pizarra en occipucio. Cola negra con ápices blancos. Revolotea en follaje denso con despliegues laterales sobre ramas. Solitario o en parejas. Común en matorrales, zonas en sucesión temprana, bordes de bosque, jardines, parques y zonas con árboles, incluyendo zonas urbanas.

Gris-oliva en espalda y rabadilla



Lados de la cabeza y parte de la coronilla negro

Ojos blancos conspicuos

Alas con márgenes amarillos

Amarillo intenso contrastante en garganta, pecho y abdomen.

< 2200 msnm



Atrapamoscas Canela

Pyrrhomyias cinnamomeus
Cinnamon Flycatcher
12 cm

Pico aplanado. Café-oliváceo por encima. Parche amarillo oculto en coronilla. Rémiges con márgenes rufos. Conspicuo y confiado, solitario o en parejas. Vuelos cortos y regresa a la misma percha. Común en bordes de bosque húmedo de zonas montañosas, barrancos, bordes de caminos y vías.



Alas negras con barras alares contrastantes canela brillante.

Garganta, pecho y abdomen color canela

Cola negruzca

< 2200 msnm



Tiranuelo Cejiamarillo

Zimmerius chrysops
Golden-faced Tyrannulet
11 cm

Pico pequeño. Barras alares débiles. Garganta y pecho blanco-grisáceo. Abdomen e infracaudales con visos amarillos. Solitario y común en follaje externo del dosel, en bosque húmedo, en secundario, bordes y árboles altos en claros de piedemonte y zonas de los orobiomas Medio y Bajo de Los Andes.

Encima color oliva



Frente y
superciliar
amarillo-dorado

Coverteras
alares y rémiges
internas
marginadas
de amarillo

500 – 2500 msnm



Elaenia Copetona

Elaenia flavogaster
Yellow-bellied Elaenia
16.5 cm

Encima café-oliva. Anillo ocular tenue blanco-opaco. Conspicua, ruidosa y común. Solitaria o en parejas, ocasionalmente en grupos. Espiga en búsqueda de insectos y fruta en matorrales de áreas semi-abiertas, secas a húmedas, bordes de bosque, y cultivos, jardines y parques.

Cresta hirsuta y conspicua



Barras alares
blancuzcas

Garganta
gris-pálido
desvanecido
a oliva-grisáceo
en pecho

Márgenes de rémiges blancas

<2300 msnm



Elaenia Montañera

Elaenia frantzii
Mountain Elaenia
14 cm

Encima oliva-pardusco. Anillo ocular amarillento. Garganta, pecho y abdomen de tono amarillo-pálido. Solitaria o en grupos. Muy frugívora. Común en bordes de bosques húmedos, zonas en sucesión, claros y cultivos son árboles o arbustos.

Cabeza muy
redonda sin cresta



Más pálido
en garganta

2 Barras alares
amarillentas

Debajo tono
amarillento
y más amarillo
en abdomen

Rémiges con margen
amarillo-pálido

1000 – 3000 msnm



Tiranuelo Gorgiblanco

Mecocerculus leucophrys
White-throated Tyrannulet
13 cm

Pico corto. Encima café-bermejo oscuro. Solitarias o en grupos, a menudo con bandadas mixtas. Común en bosques secundarios, bordes, bosques húmedos, potreros, cultivos y zonas de transición entre la media y alta montaña.

Superciliar blanca Garganta de blanco immaculado



Pecho pardusco claro

Abdomen de tono amarillento

2 Barras alares ante a rufo

Rémiges con márgenes color ante a rufo Cola larga

2600 – 3600 msnm




Tiranuelo Capigrís

Phyllomyias griseiceps
Sooty-headed Tyrannulet
10 cm

Pico corto. Espalda oliva, alas más oscuras con rémiges de márgenes blancas. Solitario en estrato medio a dosel. Común en parches de bosque seco, zonas abiertas con matorral y árboles dispersos, bordes de bosque húmedo y zonas de transición baja a media montaña.

Línea ocular negra Superciliar corta blanca



Coronilla negruzca

Garganta blanco-grisáceo

Pecho lavado oliva

Sin barras alares Abdomen amarillo

2600 – 3600 msnm



Bichofué Gritón

Pitangus sulphuratus
Great Kiskadee
22 cm

Pico negro robusto. Coronilla negra con parche amarillo oculto. Pecho y abdomen amarillo intenso. Conspicuo, agresivo y muy vocal, solitario o en parejas. Común en entornos urbanos, cultivos y bordes de bosques secos a húmedos.

Franja o corona blanca



Espalda café con alas y cola con márgenes rufos

Garganta blanca

<2600 msnm



Atrapamoscas Ganadero

Machetornis rixosa

Cattle Tyrant

19.5 cm

Pico negro. Coronilla de tono grisáceo y cresta naranja oculta en machos. Línea ocular oscura y estrecha. Parejas o pequeños grupos, usualmente en suelo. Común en zonas secas y semiabiertas, planicies y potreros.

Espalda
café-oliva

Ojos
rojos



Pecho
y abdomen
amarillos

Alas y cola
parduscas

Patas largas

<3200 msnm



Atrapamoscas Lagartero

*Myiodynastes
chrysocephalus*

**Golden-crowned
Flycatcher**

20.5 cm

Pico negro y robusto. Coronilla café-grisáceo con parche amarillo-dorado oculto. Franja malar negruzca. Mejillas y garganta ante. Encima café-oliva-grisáceo. Alas y cola con márgenes rufos. Solitario o en parejas en bosques húmedos.

Franja ocular negruzca
con superciliar blanca



Pecho y lados
con estriado
oliva difuso

Garganta, pecho
y abdomen
amarillo pálido.

1000 – 3000 msnm



Atrapamoscas Maculado

Myiodynastes maculatus

Streaked Flycatcher

20.5 cm

Pico robusto, negro con base de la mandíbula inferior rosa. Poco conspicuo, solitario o en parejas. Caza insectos en vuelos cortos. Común en bosques secundarios y bordes, zonas de transición de seco a húmedo y claros con árboles.

Superciliar y frente
amarillo-blancuzco

Franja ocular
negra



Franja malar
blanca

Pecho estriado
de negro

Pecho y abdomen
blanco con leve
tonalidad amarilla

Rabadilla y
cola rufas

Alas oscuras con
márgenes rufos

<1600 msnm



Suelda Crestinegra

Myiozetetes cayanensis
Rusty-margined Flycatcher
17 cm

Pico negro corto. Parche amarillo-dorado oculto en coronilla. Parejas o grupos. Realizan vuelos cortos desde perchas a media y baja altura. Común en bordes de bosque húmedo, transición bosque seco a húmedo y zonas semiabiertas, incluyendo cultivos y zonas urbanas.

Rémiges con
márgenes rufos



Cabeza
negra con
superciliar
blanca

Pico negro
corto

Garganta
blanca

Pecho y vientre
amarillo intenso

<2200 msnm



Sirirí Común

Tyrannus melancholicus
Tropical Kingbird
22 cm

Pico negro. Parche naranja oculto en coronilla. Pecho con color oliva difuminado. Solitario o en parejas. Conspicuo y muy común en zonas abiertas o semiabiertas, urbanas, en claros y márgenes de ríos. Se percha en estructuras naturales y antrópicas.

Espalda
oliva-grisáceo

Cabeza gris con
antifaz negro



Garganta
gris-pálido

Pecho
y abdomen
amarillos

Alas y cola
ahorquilladas

<2800 msnm



Atrapamoscas Montañero

Myiarchus cephalotes
Pale-edged Flycatcher
18.5 cm

Pico negro. Ver bien coloración blanca en cola. Solitario o en parejas. Perchas en estrato bajo a medio. Común a poco común en bordes de bosque húmedo, zona alta de piedemontes, claros, parches y zonas cultivadas.

Cresta
corta

Cabeza
café



2 Barras
alares
gris-pálido
a blanco
anteado

Garganta
y pecho
gris-blancuzco

Cola con
margen blanco

Abdomen amarillo
pálido, desgastado

1500 – 2700 msnm



Pitajo Pechirrufo

Ochthoeca rufipectoralis
Rufous-breasted Chat-Tyrant
14 cm

Pico negro corto. Encima café. Alas negruzcas. Garganta gris. Solitario, en parejas o bandadas mixtas en nivel medio-alto hasta el dosel. Común en zonas templadas y húmedas: en bordes de bosques, claros, potreros, cultivos y zonas de transición al páramo.

Coronilla negruzca

Superciliar blanca y larga



1 Barra alar canela

Banda pectoral rufo-naranja

Bajo pecho y abdomen blancos

2500 – 3200 msnm



Pitajo Ahumado

Ochthoeca fumicolor
Brown-backed Chat-Tyrant
15 cm

Pico negro corto. Alas y cola de tono negro con 2 barras alares rufas, la inferior es más grande. Solitario o en parejas. Caza con vuelo corto al aire o suelo desde percha. Común en bordes de bosques húmedos, parches, claros, cultivos y potreros en zona de transición al páramo.

Superciliar blanco-arrufado

Garganta grisácea



Blanco en centro del abdomen

Pecho y abdomen canela anteaado

Encima café-canela

2500 – 3800 msnm



Atrapamoscas Pechirrojo

Pyrocephalus rubinus
Vermilion Flycatcher
13 cm

Dimorfismo sexual. Hembra con garganta y pecho blancos, con estrías negras delgadas y difusas. Abdomen de tono rosáceo. Solitario o en parejas. Conspicuo. Caza insectos con vuelo al aire o suelo. Común en zonas abiertas: potreros, cultivos, jardines y parques.

Franja ocular, brida y occipucio café negruzco



Cresta corta

Pico negro corto

Coronilla, garganta, pecho y abdomen escarlata intenso

< 2700 msnm



Atrapamoscas Chiflaperros

Myiotheretes striaticollis
Streak-throated Bush-Tyrant
22 cm

Pico negro. Pecho, abdomen y rabadilla rufo-canela. En vuelo, cola y ala muestran área canela. Solitario o en parejas. Común en zonas deforestadas con árboles dispersos, potreros, y cultivos, bordes de bosque húmedo y en zonas de transición al páramo.



Garganta negra con estriado negro

Encima café-opaco con alas y cola negruzcas

2200 – 3400 msnm



Atrapamoscas Guardapuentes

Sayornis nigricans
Black Phoebe
16 cm

Pico negro. Cuerpo negro fuliginoso con abdomen blanco. Conspicuo y confiado. Usualmente cerca de cuerpos de agua (arroyos y ríos). Caza mediante vuelos cortos desde percha. Común en zonas de piedemonte y montañas en bosques secos a húmedos.



Coberteras alares superiores con blanco

Márgenes anchos y blancos en rémiges internas

Rectrices externas con blanco

200 – 2800 msnm



Atrapamoscas Verdoso ^{MB}

Empidonax virescens
Acadian Flycatcher
13 cm

Pico aplanado. Garganta blanca. Pecho y abdomen blancuzco con tonos amarillos pálidos; pecho teñido de oliva. Inconspicuo, solitario o en grupos laxos. Vuela cortas distancias al aire o al follaje sin regresar a la misma percha. En estratos bajos de bosques, vegetación secundaria y zonas con árboles.

Anillo ocular débil, blanco amarillento



Mandíbula inferior amarillenta

2 Barras alares blanquecinas con tono amarillos o canela

Encima verde-oliva opaco

< 2800 msnm

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Remsen, J. V., Jr., J. I. Areta, E. Bonaccorso, S. Claramunt, D. F. Lane, L. N. Naka, M. B. Robbins, F. G. Stiles, and K. J. Zimmer. Version (2 March 2026). A classification of the bird species of South America. Museum of Natural Science, Louisiana State University. <http://www.museum.lsu.edu/~Remsen/SACCBaseline.htm>

Hilty, S. L. & Brown, W. L. (2001). Guía de las Aves de Colombia. American Bird Conservancy. Cargraphics S. A.

Ayerbe-Quiñones, F. (2018). Guía ilustrada de la Avifauna colombiana. Wildlife Conservation Society. Panamericana Formas e Impresos S. A.

Fotografía: Juan Manuel Quintero



Guía de las Aves del
CORREDOR TURÍSTICO
DEL NIMA



SABERES DE LA CUENCA | 3ª EDICIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA POTRERILLO